

檔 號：
保存年限：

農業部農糧署 函

地址：54044南投縣南投市光華路8號
承辦人：朱慧敏
電話：049－2332380分機1027
傳真：049－2341116
電子信箱：chm1212@mail.afa.gov.tw

受文者：暉凱國際檢驗科技股份有限公司


發文日期：中華民國113年8月21日
發文字號：農糧企字第1131109626號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：函轉農業部公告修正「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍各
1份案，請查照。

說明：依據農業部113年8月8日農授防字第1131876445號書函辦
理。（相關資料請至<https://reurl.cc/N1A7Mk>下載）

正本：環球國際驗證股份有限公司、中華驗證有限公司、采園生態驗證有限公司、國立
中興大學農產品驗證中心、成大智研國際驗證股份有限公司、國立屏東科技大學
農水產品檢驗與驗證中心、安心國際驗證股份有限公司、雲嘉國際驗證股份有限
公司、暉凱國際檢驗科技股份有限公司、財團法人農業科技研究院、環虹鋁騰科
技股份有限公司、台灣食農安全檢驗股份有限公司、藍鵲驗證服務股份有限公
司、朝陽科技大學、彩虹大地有限公司、亞瑞仕國際驗證股份有限公司、全民儲
碳股份有限公司、稻香驗證有限公司、奕嘉國際有限公司

副本：財團法人全國認證基金會、本署企劃組



檔 號：
保存年限：

農業部 書函

地址：100212臺北市南海路37號

承辦人：王筱婷

電話：(02)3343—6430

傳真：(02)2304—7355

電子信箱：htwang@aphia.gov.tw

受文者：本部農糧署

發文日期：中華民國113年8月8日

發文字號：農授防字第1131876445號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：公告pdf檔、公告(稿)odf檔、附件pdf檔(副本受文者請至本部動植物防疫檢疫署網站下載<https://www.aphia.gov.tw/>，驗證序號：1131876445)

主旨：檢送本部公告修正「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍（含附件）1份，請刊登行政院公報。

正本：行政院公報編印中心（請刊登公報）

副本：衛生福利部食品藥物管理署、環境部、經濟部標準檢驗局、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣動植物防疫所、嘉義市政府、嘉義縣政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、基隆市政府、宜蘭縣政府、花蓮縣動植物防疫所、臺東縣政府、金門縣政府、連江縣政府、澎湖縣政府、臺灣植物保護工業同業公會、中華民國植物保護商業同業公會全國聯合會、臺北市植物保護商業同業公會、作物永續發展協會臺灣分會、本部農糧署、本部農業試驗所、本部農業藥物試驗所、本部桃園區農業改良場、本部臺中區農業改良場、本部苗栗區農業改良場、本部臺南區農業改良場、本部高雄區農業改良場、本部花蓮區農業改良場、本部臺東區農業改良場、本部茶及飲料作物改良場、本部種苗改良繁殖場



農業部農糧署總收文



正 本

檔 號：
保存年限：

農業部農糧署 書函

地址：54044南投縣南投市光華路
8號

540207

南投縣南投市光華路8號

承辦人：范救晨

電話：049-2341126

傳真：049-2359784

電子信箱：ctcfdfmc@mail.afa.gov.tw

受文者：本署企劃組

發文日期：中華民國113年8月14日

發文字號：農糧資字第1131018838號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如說明

主旨：農業部公告修正「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍案，請查照。

說明：依據農業部113年8月8日農授防字第1131876445號書函（如附件）辦理。

正本：本署企劃組、蔬菜及種苗產業組、果樹及花卉產業組、雜糧特作組、稻作產業組、北區分署、中區分署、南區分署、東區分署

副本：本署農業資源組(含附件)



裝


訂

線

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年8月8日
發文字號：農授防字第1131876445A號



主旨：公告修正「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「氣派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 8 月 8 日農授防字第 1131876445A 號公告修正

500 g/L (50% w/v) 氣派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
落花生	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
紅豆	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
甘藷	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
豆薯	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
山藥	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蘿蔔	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
蕪菁	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				將稀釋液噴佈於土表。						
牛蒡	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
蒜	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。					適用於蒜頭。	
薑	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
芋	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
番茄	根瘤線蟲	0.2 公升	4,000	於植株定植後第 3 天澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線	0.1-0.3	4,000	於植株定植後					施用前請保	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蟲	公升		澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					持土壤濕 潤。	
茄子	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
枸杞	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
香瓜茄	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
樹番茄	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆					施用前請保 持土壤濕 潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				灌 250-1,000 公升藥液。						
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
香蕉	根瘤線蟲	0.45 公升	10,000	限苗期使用，使用前須維持根圍土壤濕						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。						
草莓	根瘤線 蟲	0.46- 0.72 公 升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用 前保持土壤濕 潤。						
柑桔類	柑桔線 蟲	0.5 公 升	2,000	作物春芽萌發 時使用，先以適 量水量潤濕土 壤，再沿樹冠滴 水線澆灌 2 公升 藥液 1 次。					依使用方法 用藥，無需 訂定安全採 收期。	本項新 增。原 始登記 廠商名 稱：台 灣拜耳 股份有 限公司。

400 g/L (40% w/v) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
落花生	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
紅豆	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
甘藷	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
豆薯	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
山藥	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蘿蔔	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
蕪菁	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
牛蒡	根瘤線	0.5 公	3,000	播種後子葉展						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蟲	升		開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
馬鈴薯	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蒜	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。					適用於蒜頭。	
洋蔥	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
胡蘿蔔	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
薑	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
芋	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
番茄	根瘤線蟲	0.266 公升	3,000	於植株定植後第 3 天澆灌稀釋藥液 1 次，					施用前保持土壤濕潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。						
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
香瓜茄	根瘤線	0.1-0.4	3,000	於植株定植後					施用前請保	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蟲	公升		澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					持土壤濕 潤。	
樹番茄	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
瓜菜類	根瘤線 蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 50-1,000 公 升藥液。					1. 施用前 請保持 土壤濕 潤。 2. 胡瓜、 美濃瓜 嫩葉接 觸到較 高劑量 氟派瑞 時，會 引起葉 緣發生 黃白化 藥斑之 現象。	
瓜果類	根瘤線 蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆					1. 施用前 請保持 土壤濕 潤。 2. 胡瓜、 美濃瓜	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				灌 50-1,000 公 升藥液。					嫩葉接 觸到較 高劑量 氟派瑞 時，會 引起葉 緣發生 黃白化 藥斑之 現象。	
香蕉	根瘤線 蟲	0.6 公 升	7,500	限苗期使用， 使用前須維持 根圈土壤濕 潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。						
草莓	根瘤線 蟲	0.62- 0.96 公 升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用 前保持土壤濕 潤。						
柑桔類	柑桔線 蟲	0.6 公 升	1,600	作物春芽萌發 時使用，先以適 量水量潤濕土 壤，再沿樹冠滴 水線澆灌 2 公升 藥液 1 次。					依使用方法 用藥，無需 訂定安全採 收期。	本項新 增。原 始登記 廠商名 稱：台 灣拜耳 股份有 限公司。